

Kiehl-RapiDés-plus

Folyékony gyors fertőtlenítés

- ▶ Felhasználásra kész fertőtlenítőszer
- ▶ Hatékony grampozitív és gramnegatív baktériumok (beleértve szalmonella és lisztéria), élesztőgombák, betokosodott vírusok (beleértve HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), adeno-, noro- és rotavírusok ellen (korlátozott spektrumú virucid aktivitás)
- ▶ Tuberkulocid és mikobaktericid
- ▶ Rövid száradási idő
- ▶ A felületek száradás után azonnal újra használhatóak
- ▶ Ivóvízes öblítés nem szükséges
- ▶ Aldehyd, illat- és színezékanyag mentes
- ▶ 4 °C-on hűtőszekrények és hűtőpultok fertőtlenítésére is alkalmas
- ▶ Élelmiszeriparban ártalmatlan felhasználásáról tanúsítvánnyal rendelkezik



Felhasználási terület

Alkoholálló felületek fertőtlenítésére. Ne használjuk akrilüvegen, alkoholra vagy festékre érzékeny felületeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A durvább, olajos, zsíros és fehérjetartalmú szennyeződések előbb el kell távolítani. A felhasználási területnek megfelelően permetező- (aeroszolmentes) vagy szórófejet alkalmazunk.

Felületi fertőtlenítés:

A felületeket, eszközöket, tárgyakat a hígítatlan szerrel teljesen benedvesítjük és a behatási idő alatt nedvesen tartjuk. Hagyjuk megszáradni vagy a behatási idő után a felületet egy száraz, egyszer használatos kendővel töröljük le.

Anyagszükséglet: 7,0–50,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt mindig olvassák el a címkét és a termékleírást.

Összetevők

Vízoldható oldószerek.
pH-érték (koncentráltum): kb. 5,5

Hatóanyagok 100 g-ban:

63,0 g ethanol (CAS: 64-17-5).

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS02, GHS07, Vesztély. H225 Fokozottan tűzvesztélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 Szemvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Tartalmaz: Ethyl Alcohol (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j350547	6 x 750 ml kerek flakonok 1 szórófejjel (kartonban)	64
j3505k47	Carton of 6 x 750 ml pear shaped bottles with 6 sprayers	64
j350505	2 x 5 L kannák (kartonban)	56

Kiehl-RapiDés-plus

Folyékony gyors fertőtlenítés

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő
EN 16615 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatással	baktericid / levurocid	alacsony	hígítatlanul	2 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	korlátozott spektrumú virucid aktivitás			

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az ipari, intézményi és élelmiszeripari területen

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid (20 °C-on és 4 °C-on)	alacsony	hígítatlanul	2 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	korlátozott spektrumú virucid aktivitás			

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő
orvosi terület				
EN 13727 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	alacsony	hígítatlanul	15 s
EN 13624 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	alacsony	hígítatlanul	15 s
EN 17387 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	alacsony	hígítatlanul	3 perc
VAH-minősített felhasználási javaslat felületi fertőtlenítéshez mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	alacsony	hígítatlanul	5 perc
EN 14348 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	myko-baktericid	alacsony	hígítatlanul	1 perc
EN 17387 Kvantitatív felületi kísérlet	myko-baktericid	alacsony	hígítatlanul	1 perc
ipari, intézményi és élelmiszeripari terület				
EN 1276 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	alacsony	hígítatlanul	1 perc
EN 1650 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	alacsony	hígítatlanul	1 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid (20 °C-on és 4 °C-on)	alacsony	hígítatlanul	1 perc

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de

Kiehl-RapiDés-plus

Folyékony gyors fertőtlenítés

Vizsgálati módszer	Hatékonysági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő
virucid				
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	korlátozott spektrumú virucid aktivitás	alacsony	hígítatlanul	2 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	korlátozott spektrumú virucid aktivitás	alacsony	hígítatlanul	2 perc
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	Murines Norovírus (MNV)	alacsony	hígítatlanul	1 perc
	Adenovírus			2 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	Murines Norovírus (MNV)	alacsony	hígítatlanul	1 perc
	Adenovírus			2 perc

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de